

Akineton (biperidenlaktat) 5 mg/ml injektionsvätska, lösning. Akineton (biperidenhydroklorid) 2 mg tabletter. Rx, F, N04AA02 (Medel vid parkinsonism), SPC 2018-08-24. **Indikationer:** Parkinsonism. Medikamentellt betingade extrapyramidala symtom (akut dystoni och initial dyskinesi). **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, stenosis i magtarmkanalen och megacolon, trång kammarvinkel med risk för akut glaukom, tardiv dyskinesi. **Varningar och försiktighet:** Vid prostatahypertrofi, förhöjd krampbenägenhet och takykardi. Behandling av äldre ska ske med försiktighet och behandlingstiden ska vara så kort som möjligt. Effekt och behov av behandling ska utvärderas kontinuerligt. Akineton tabletter innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption. **För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.** Misstänkt biverkningar bör rapporteras till www.lakemedelsverket.se och info@poaab.com. **Innehavare Av Godkännande För Försäljning:** Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l. Via Cavour, 70, 27035 Mede (PV), Italien.